

Research Paper

Comparative Integrated Prioritization of the Status and Performance Conditions of Iran's Second-Order Watersheds Using Game Theory

Seyed Hamidreza Sadeghi¹, Reza Chamani², Mostafa Zabihi Silabi²,
Mohammad Tavosi², Azadeh Katebikord², Hamid Nouri³,
Abdulvahed Khaledi Darvishan⁴, Vahid Moosavi⁴, Padideh Sadat Sadeghi⁵,
Mehdi Vafakhah⁶, and Hamidreza Moradi Rekabdarkolaei⁶

- 1- Professor, Department of Watershed Management Engineering, Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modares University, Noor, Iran, (Corresponding author: sadeghi@modares.ac.ir)
- 2- Former Ph.D. Student, Department of Watershed Management Engineering, Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modares University, Noor, Iran
- 3- Associate Professor, Faculty of Natural Resources and Environment, Malayer University, Malayer, Iran; At present: Director, International Center for Integrated Management of Watershed and Bio-Resources in Arid and Semi-Arid Regions (ICIMWB), Natural Resources and Watershed Management Organization of Iran, Tehran, Iran
- 4- Associate Professor, Department of Watershed Management Engineering, Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modares University, Noor, Iran
- 5- Former M.Sc. Student, Department of Watershed Management Engineering, Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modares University, Noor, Iran
- 6- Professor, Department of Watershed Management Engineering, Faculty of Natural Resources, Tarbiat Modares University, Noor, Iran

Received: 05 February, 2025

Revised: 05 April, 2025

Accepted: 14 May, 2025

Extended Abstract

Background: Protection, exploitation, and sustainable management of watershed resources are priorities in meeting the needs of the growing population. Damage to natural resources leads to irreparable effects, such as severe floods, soil erosion, and, as a result, human and financial losses. Therefore, on the one hand, it is necessary to implement programs for the protection and restoration of natural resources. On the other hand, the lack of credits and economic, technical, and time limitations in different watersheds cause management measures to be taken in parts of watersheds that have more sensitive conditions than other areas. Based on this, prioritizing different areas of a watershed based on the severity of the problem is a valuable tool for the government in preparing regional development strategies. However, it is necessary to use an appropriate approach to make a management decision, considering the opinions of all stakeholders and reducing expert opinions. However, this issue of the watershed area has received less attention. In this regard, game theory has been used in the current research for the comparative prioritization of second-order watersheds in the country due to the reduction of the effect of expert opinion. The results of this research will help policymakers, managers, and decision-makers in the comprehensive management of watersheds in the country and the conservation of water and soil resources. Achieving detailed and operational approaches on operational scales requires extensive research on a larger scale and in sectors or watersheds with high management priority.

Methods: Some 44 national and accessible climatic, human, hydrological, and natural criteria were initially selected for the comparative prioritization of the country's second-order watersheds. Next, the values of study criteria were extracted for each watershed of the second category, and the necessary scaling was done according to the nature of the criteria and the type of their effect on the performance of the watersheds. The statistical measure of the variance inflation factor was used to eliminate the internal correlation of the study criteria. In this regard, 26 criteria were finalized for comparative prioritization. The Condorcet approach was used for comprehensive comparative prioritization, considering 26 criteria in the next step. In this regard, the values of the final criteria were ranked in 30 watersheds. In this regard, the watershed with the best condition in terms of the study criteria was ranked first, and the watershed with the worst condition was ranked last. This procedure was considered for all the study criteria. After ranking the watersheds by considering the criteria, a comparative prioritization was done between the second-order watersheds in the country, and the watersheds with the highest and lowest ranges in pairwise comparisons were identified as low and high-priority watersheds, respectively.

Results: The 30 watersheds of the country have been ranked first to fourth among the 26 study criteria at least once. In this regard, the Jarahi and Zohreh Watershed, with three points, and the Daranjir and



Saghar Desert Watershed, with 54 points, respectively, have the lowest and highest points and the worst and best conditions according to the 26 final criteria. Examining the condition of the Jarahi and Zohreh Watershed showed that this watershed could be in a better condition regarding drainage density, specific erosion, and the density of order 4 streams. On the other hand, the condition of the Daranjir desert is better in the naturalness index, recharge volume of groundwater, carbon monoxide concentration, density of stream ordered 4, migration, specific erosion, population, and human outflow than the majority of watersheds. According to the study criteria, the status and functional conditions of the Jarahi and Zohreh Watershed in the southwest, the Hamon Jazmurian Watershed in the southeast, Bandar Abbas and Sedij Border Watersheds in the south, the Central Desert and Abarghou-Sirjan Desert Watersheds in the center, Urmia Lake, and the Sefidroud and Haraz Watershed in the northwest are weak in comparison with the other watersheds and should be given more attention. Based on the results, the watersheds of Jarahi and Zohreh, with three, and Deranjir desert, with 54 points, respectively, have the least and the most points and have the worst and the best possible conditions. Based on the obtained results, various variables are effective in prioritizing the country's watersheds, which requires a detailed and scientific evaluation of their individual effects on the performance of watersheds. The results of this research can contribute to allocating funds to provide management solutions and conducting detailed implementation studies on larger scales and smaller watersheds.

Conclusion: In the current research, the set of influential and available variables in watersheds has been used for comparative prioritization. It should be noted that because the comparison in the Condorcet approach is based on pairwise comparisons, Jarahi and Zohreh and Daranjir Desert Watersheds are the sub-watersheds that have experienced the highest and lowest losses, respectively, in the pairwise comparisons between the other sub-watersheds in the criteria as mentioned above. Therefore, the prioritization results will be reliable when the relevant manager is fully aware of the prioritization process, the type of criteria, and the purpose of the present study. Naturally, the results of the scale used in the current research need to provide the possibility of preparing and compiling executive plans for watershed management in the country. However, they provide a reasonable basis for focusing the attention of the departments and organizations in charge of protecting the country's water and soil resources for policy-making and planning on a national scale. It also provides detailed and goal-oriented studies on a large scale in high-priority watersheds. However, more extensive research is recommended with other prioritization methods based on game theory and similar approaches based on technical criteria.

Keywords: Comprehensive watershed management, Condorcet approach, National planning, National scale

How to Cite This Article: Sadeghi, S H R., Chamani, R., Zabihi Silabi, M., Tavosi, M., Katebikord, A., Nouri, H., Khaledi Darvishan, A., Moosavi, V., Sadeghi, P S., Vafakhah, M., & Moradi Rekabdarkolaei, H. (2025). Comparative Integrated Prioritization of the Status and Performance Conditions of Iran's Second-Order Watersheds Using Game Theory. *J Watershed Manage Res*, 16(2), 63-78. DOI: 10.61882/jwmr.2025.1285

مقاله پژوهشی

اولویت بندی جامع مقایسه ای وضعیت و شرایط عملکردی آبخیزهای رده دوم کشور با استفاده از تئوری بازی

سید حمیدرضا صادقی^{۱*}، رضا چمنی^۲، مصطفی ذبیحی سیلابی^۲، محمد طاووسی^۲، آزاده کاتبی کرد^۲، حمید نوری^۳، عبدالواحد خالدی درویشان^۴، وحید موسوی^۴، پدیده السادات صادقی^۵، مهدی وفاخواه^۶ و حمیدرضا مرادی رکابدار کلانی^۶

۱- استاد، گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران (نویسنده مسوول: sadeghi@modares.ac.ir)

۲- دانش آموخته دکتری، گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران

۳- دانشیار دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست، دانشگاه ملایر و در حال حاضر مدیر مرکز بین المللی مدیریت جامع حوزه های آبخیز و منابع زیستی در مناطق خشک و

نیمه خشک تحت پوشش یونسکو، سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، تهران، ایران

۴- دانشیار، گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران

۵- دانش آموخته کارشناسی ارشد، گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران

۶- استاد، گروه مهندسی آبخیزداری، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تربیت مدرس، نور، ایران

تاریخ پذیرش: ۱۴۰۴/۰۲/۲۴

تاریخ ویرایش: ۱۴۰۴/۰۱/۱۶
صفحه: ۶۴ تا ۷۸

تاریخ دریافت: ۱۴۰۳/۱۱/۱۷

چکیده مبسوط

مقدمه: حفاظت، بهره برداری و مدیریت پایدار منابع طبیعی حوزه های آبخیز برای تأمین نیازهای جمعیت روبه رشد از اولویت خاصی برخوردار هستند. آسیب به منابع طبیعی عوارض جبران ناپذیری از جمله سیلاب های شدید، فرسایش خاک و در نتیجه خسارات جانی و مالی را به دنبال دارد. بنا بر این، از یک سو اجرای برنامه های حفاظت و احیای منابع طبیعی ضروری است و از سوی دیگر کمبود اعتبارات و محدودیت های اقتصادی، فنی و زمانی در حوزه های آبخیز مختلف باعث می شوند تا اقدامات مدیریتی در قسمت هایی از حوزه های آبخیز که شرایط حساس تری نسبت به سایر مناطق دارند، انجام شوند. بر همین اساس، اولویت بندی مناطق مختلف یک حوزه آبخیز براساس شدت مشکل ابزار مفیدی برای دولت در تهیه راهبردهای توسعه منطقه ای است. با این حال، استفاده از یک رویکرد مناسب برای اتخاذ یک تصمیم مدیریتی با لحاظ نظر تمامی گروه داران و کم کردن نظرات کارشناسی ضروری است، حال آن که این موضوع در مقیاس حوزه آبخیز کمتر مورد توجه قرار گرفته است. در همین راستا، در پژوهش حاضر برای اولویت بندی مقایسه ای حوزه های آبخیز درجه دوم کشور از نظریه بازی به دلیل کاهش اثر نظر کارشناسی استفاده شده است. امید است که نتایج این پژوهش سیاست گذاران، مدیران و تصمیم گیران در مدیریت جامع آبخیزهای کشور و حفظ منابع آب خاک را یاری کنند. اگرچه دستیابی به رویکردهای تفصیلی و اجرایی در مقیاس های عملیاتی نیازمند انجام پژوهش های گسترده تر با مقیاس بزرگ تر و در بخش ها و یا آبخیزهای با اولویت مدیریتی بالا است.

مواد و روش ها: برای اولویت بندی مقایسه ای حوزه های آبخیز درجه دوم کشور در ابتدا ۴۴ معیار ملی و قابل دسترس اقلیمی، انسانی، هیدرولوژیکی و طبیعی انتخاب شدند. در ادامه، مقادیر معیارهای مورد مطالعه برای هر یک از حوزه های آبخیز درجه دوم استخراج شدند و با توجه به ماهیت معیارها و نوع تأثیر آن ها بر عملکرد آبخیزها، مقیاس بندی لازم انجام شد. برای حذف همبستگی درونی معیارهای مطالعه، از معیار آماری عامل تورم واریانس استفاده شد. در همین راستا، ۲۶ معیار برای اولویت بندی مقایسه ای نهایی شدند. در مرحله بعد، رویکرد Condorcet برای اولویت بندی جامع مقایسه ای با در نظر گرفتن ۲۶ معیار استفاده شد. در همین راستا، مقادیر معیارهای نهایی شده در آبخیزهای ۳۰ گانه رتبه بندی شدند. آبخیزی که بهترین وضعیت را از لحاظ معیار مطالعاتی داشت در رتبه اول و آبخیز با بدترین وضعیت در رتبه آخر قرار گرفتند و این روال برای تمامی معیارهای مطالعاتی مدنظر قرار گرفت. پس از رتبه بندی آبخیزها با در نظر گرفتن معیارها، اولویت بندی مقایسه ای بین آبخیزهای رده دوم کشور انجام و آبخیزهای با بیشترین و کمترین برد در مقایسات جفتی، به ترتیب به عنوان آبخیزهای با اولویت کم و بالا شناسایی شدند. در نهایت، نقاط ضعف و قوت آبخیزهای مطالعاتی با توجه به معیارهای مورد بررسی مشخص شدند.

یافته ها: براساس نتایج، آبخیزهای ۳۰ گانه کشور در بین ۲۶ معیار مطالعاتی حداقل یکبار در رتبه های اول تا چهارم قرار گرفته اند. آبخیزهای جراحی و زهره با ۳ و کویر درانجیر با ۵۴ امتیاز به ترتیب دارای کمترین و بیشترین امتیاز و بدترین و بهترین شرایط را با توجه به ۲۶ معیار نهایی شده دارند. بررسی وضعیت آبخیز جراحی و زهره نشان می دهد که این آبخیز از لحاظ تراکم زهکشی، فرسایش ویژه و تراکم آبراهه های با رتبه چهار وضعیت خوبی ندارد. از سوی دیگر، وضعیت کویر درانجیر در شاخص طبیعت گرایی، تغذیه آب های زیرزمینی، غلظت کربن مونواکسید، تراکم آبراهه های با رتبه ۴، مهاجرت، فرسایش ویژه، جمعیت و جریان خروجی انسانی در مقایسه با غالب آبخیزها بهتر است. با توجه به معیارهای مطالعاتی، وضعیت و شرایط عملکردی آبخیز جراحی و زهره در جنوب غربی، آبخیز هامون جازموریان در جنوب شرقی، آبخیز بندرعباس-سیدج در جنوب، آبخیزهای کویر مرکزی و ابرقو سیرجان در مرکز و آبخیزهای دریاچه ارومیه، سفیدرود و ارس در شمال غربی در مقایسه با سایر آبخیزها ضعیف هستند و باید بیش تر مورد توجه قرار گیرند. بر اساس نتایج به دست آمده، متغیرهای مختلفی در اولویت بندی حوزه های آبخیز کشور مؤثر هستند که نیاز به ارزیابی دقیق و علمی تأثیرات هر یک بر عملکرد حوزه های آبخیز دارد. هم چنین، نتایج این تحقیق می تواند سهم ارزنده ای در نحوه تخصیص اعتبارات در ارائه راهکارهای مدیریتی و انجام مطالعات دقیق اجرایی در مقیاس بزرگ تر و حوزه های آبخیز کوچک تر داشته باشند.

نتیجه گیری: در پژوهش حاضر، از مجموعه متغیرهای تأثیرگذار و در دسترس در آبخیزها برای اولویت بندی مقایسه ای آن ها استفاده شده است. لازم به ذکر است که با توجه به این که مبنای مقایسه در رویکرد Condorcet مقایسه های جفتی است، بنا بر این زیر آبخیزهای جراحی و زهره و کویر درانجیر زیر آبخیزهایی هستند که در مقایسه های جفتی بین سایر زیر آبخیزها در معیارهای مذکور، به ترتیب بیشترین و کمترین باخت را تجربه کرده اند. بر این اساس، نتایج اولویت بندی زمانی قابل اعتماد خواهند بود که مدیر مربوطه با فرایند اولویت بندی، نوع معیارها و همچنین هدف مطالعه حاضر آگاهی کامل داشته باشد. طبیعتاً، نتایج حاصل از مقیاس مورد استفاده در پژوهش فعلی، امکان تهیه و تدوین طرح های اجرایی مدیریت آبخیزهای کشور را مهیا نمی کند ولی زیربنای خوبی برای تمرکز توجهات بخش ها و سازمان های متولی حفاظت منابع آب و خاک کشور در خصوص سیاست گذاری و برنامه ریزی در مقیاس ملی و سپس انجام مطالعات تفصیلی و هدفمندانه در مقیاس های بزرگ در آبخیزهای با اولویت بالا را فراهم نموده اند. اگرچه انجام پژوهش های گسترده تر با سایر شیوه های اولویت بندی مبتنی بر تئوری بازی و با سایر رویکردهای مشابه و بر اساس معیارهای فنی گسترده تر پیشنهاد می شود.

واژه های کلیدی: برنامه ریزی ملی، رویکرد کندورس، مدیریت جامع حوزه های آبخیز، مقیاس ملی

مقدمه

حفاظت، بهره‌برداری و مدیریت پلیدار منابع طبیعی آبخیز برای تأمین نیازهای جمعیت روبه‌رشد از اولویت ویژه‌ای برخوردار هستند. یکی از تبعات افزایش جمعیت و بالا رفتن تقاضا، زیر کشت بردن زمین‌های حساس به فرسایش توسط کشاورزان و به دنبال آن تخریب زمین و منابع طبیعی است. تخریب زمین از ترکیبی از تغییرات کاربری زمین، تشدید کشاورزی و رخدادهای شدید بارشی ناشی می‌شود (Davudirad et al., 2016). آسیب به منابع طبیعی اثرات جبران‌ناپذیری از قبیل وقوع سیلاب‌های شدید، فرسایش خاک و در نتیجه خسارت‌های جانی و مالی را به دنبال دارد (Sadeghi et al., 2024). بنا بر این، از سویی نیازمند اجرای برنامه‌های حفاظت و احیای منابع طبیعی است و از سوی دیگر، کمبود اعتبارات و محدودیت‌های اقتصادی، فنی و زمانی در آبخیزهای مختلف باعث می‌شوند که اقدامات مدیریتی و آبخیزداری برای کاهش هزینه‌های مرتبط در بخش‌هایی از آبخیز و یا فقط در برخی آبخیزها انجام گیرند که شرایط حساس‌تری نسبت به دیگر مناطق دارند (Zabihi Silabi et al., 2021). بنا بر این، اولویت‌بندی مناطق مختلف یک حوزه آبخیز بر اساس شدت مشکل، ابزار مفیدی برای دولت در تهیه راهبردهای توسعه منطقه‌ای است (Adhami & Sadeghi, 2016; Sadeghi et al., 2023). به‌نحوی که اولویت‌بندی، شرایط مناسب برای تصمیم‌گیران در توجه بیش‌تر برای مدیریت و تخصیص اعتبار برای آبخیزهای با شرایط نامناسب را فراهم می‌سازد. هم‌چنین، در تخصیص بودجه و مشخص کردن این که کدام آبخیز یا زیرآبخیزها به حمایت پژوهشی بیش‌تر نیاز دارند به مدیران آبخیز برای مدیریت آسان و مقرون‌به‌صرفه کمک می‌کند (Adhami & Sadeghi, 2016). حوزه آبخیز یک سامانه پیچیده و چندبعدی است (Han et al., 2020). از همین‌رو، بسیاری از مشکلات و چالش‌های رخ داده در حوزه آبخیز ناشی از عوامل متعددی مانند وجود ذی‌نفعان مختلف، رشد جمعیت، کمبود منابع آب‌و‌خاک، شهرنشینی، صنعتی‌شدن جامعه و استفاده نامتعادل از منابع بوده‌اند (Talebi et al., 2021; Nikjoy, 2023). این در حالی است که در دهه‌های گذشته، به‌دلیل آگاهی کم سیاستمداران از مشکلات مرتبط با هر حوزه آبخیز و عدم لحاظ شرایط هر زیرآبخیز در مقایسه با سایر زیر آبخیزها، شناسایی مشکل و تخصیص بودجه متناسب با آن با یک رویکرد مناسب صورت نگرفته است (Ali Moradi et al., 2021; Najafi, 2015; Sadeghi et al., 2023). با توجه به گستردگی حوزه‌های آبخیز و وجود تنوع در شرایط اقلیمی، زمین‌شناسی، خاک، توپوگرافی، هیدرولوژی و پوشش گیاهی مختلف، اتخاذ یک رویکرد مدیریتی مناسب برای کاهش مشکلات و چالش‌های به‌وجود آمده در حوزه‌های آبخیز مختلف بسیار سخت است (Nasiri Khiavi et al., 2023). در همین راستا، استفاده از روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره^۱ به‌عنوان راهکاری برای انتخاب و اجرای بهترین گزینه یا گزینه‌ها و برای اولویت‌بندی زیرآبخیزها با توجه به معیارهای مختلف تصمیم‌گیری مدنظر قرار گرفته است (Tecle, 1192; Lamy et al., 2002).

(Bekele & Nicklow, 2005; Lee, 2012). در پژوهش‌های متعدد از روش‌های مختلف تصمیم‌گیری چندمعیاره شامل الگوریتم ژنتیک^۲ (Akbari et al., 2015)، تحلیل سلسله‌مراتبی^۳ (Pourghasemi et al., 2012)، روش منطق فازی^۴ (Üçler et al., 2015)، سامانه پشتیبان تصمیم^۵ (Dragan et al., 2011)، برنامه‌ریزی چندهدفه^۶ (Weng et al., 2010)، برنامه‌ریزی خطی^۷ (Amir & Fisher, 1999)، برنامه‌ریزی خطی چندمتغیره^۸ (Nikkami et al., 2002) و نظریه رأی‌گیری^۹ (Laukkanen et al., 2002) در زمینه‌های مختلف تخصیص منابع، فرسایش و رسوب، مدیریت منابع آب و مدیریت آبخیز استفاده شده است. اغلب روش‌های فوق برای تصمیم‌سازی، معیارهای مشخص مربوط به هر جنبه از مسئله را تعیین و در نهایت با مقایسه میزان اهمیت معیارها اولویت‌ها را مشخص می‌کنند. به بیان دیگر، این روش‌ها به نظر شخصی و کارشناسی فرد امتیازدهنده وابسته هستند (Mendoza & Martins, 2006). با این حال، به‌دلیل وجود گروداران مختلف در یک محیط مشترک در سامانه آبخیز، تصمیمات اتخاذشده توسط گروداران مختلف می‌تواند رفتار سایر گروداران و در نتیجه رفتار پیچیده سامانه حوزه آبخیز را نیز تحت‌تأثیر قرار دهند (Daneshiet et al., 2017). در نتیجه، استفاده از یک رویکرد مناسب برای اتخاذ یک تصمیم مدیریتی با لحاظ نظر تمامی گروداران و کم‌کردن نظرات کارشناسی ضروری است. در همین راستا، اهمیت استفاده از روش‌هایی مانند نظریه بازی به دلیل کاهش اثر نظر کارشناسی است (Sheikhmohammady & Madani, 2008). نظریه بازی ابزاری ریاضی برای تجزیه و تحلیل مسائل پیچیده است (Adhami & Madani, 2010; Lee, 2012; Sadeghi, 2016). بنا بر این، نظریه بازی را زمانی می‌توان استفاده کرد که منابع محدود، گزینه‌های مختلف تصمیم‌گیری، نتایج متفاوت حاصل از انتخاب‌های متفاوت و امکان رقابت یا همکاری بین بازیگران وجود داشته باشند، به‌نحوی که نظریه بازی از طریق مدل‌سازی تعامل تصمیم‌گیرندگان، هماهنگی و ایجاد تعادل، به حل اختلاف نظرات در خصوص رویکردهای مختلف در مدیریت آب‌و‌خاک می‌پردازد (Madani et al., 2014). بررسی مستندات نشان می‌دهد که نظریه بازی در زمینه‌های مختلف علمی از جمله اقتصاد (Ichiishi, 2014) و جامعه‌شناسی (Lee, 2012; Colman et al., 2008)، مدیریت منابع آب (Madani, 2010; Pursiahi, 2008)، مدیریت مناطق (Samiyan & Karachian, 2011; Parrachino et al., 2006; Kucukmehmetoglu, 2012; Zhu et al., 2022)، منابع آب و تخصیص حقوق (Eleftheriadou & Mylopoulos, 2008; Jalili Kamjoo & Khosh Akhlagh, 2016; da Silva et al., 2023)، مشکلات بهره‌برداری از مخازن آب (Shirangi et al., 2008) و مدیریت کیفیت آب (Shi et al., 2013; Olatinwo & Joubert, 2022) استفاده شده است. با این وجود، نظریه بازی با ظرفیت کامل خود در تجزیه و تحلیل سامانه در مدیریت منابع آب و خاک به‌ویژه در مقیاس آبخیز کم‌تر مورد استفاده قرار گرفته است. در همین راستا، ادومی و

^۶ Multi Objective Programming, MOP^۷ Linear Programming^۸ Multi Linear Programming^۹ Voting Theory^۱ Multi Criteria Decision Making, MCDM^۲ Genetic Algorithm^۳ Analytical Hierarchy Process, AHP^۴ Fuzzy Logic System^۵ Decision Support System, DSS

آزمایشی^۴ تحت تأثیر خشک‌سالی در Apennines ایتالیا استفاده کرده‌اند. در پژوهش مذکور، با استفاده از ۱۹ معیار فیزیکی و شیمیایی خاک، اولویت‌دارترین تاکستان‌ها در پاسخ به تنش خشکی در عمق‌های ۰-۳۰، ۳۰-۹۰ و ۹۰-۱۰۰ سانتی‌متری شناسایی شدند. نتایج پژوهش نشان دادند که تاکستان‌های موجود در مناطق BPR 2 و CRT 1 به ترتیب در اعماق ۰-۳۰ و ۳۰-۹۰ سانتی‌متری به عنوان اولویت‌دارترین تاکستان‌ها در مواجهه با تنش خشکی انتخاب شدند، در حالی که در هر دو عمق ۰-۳۰ و ۳۰-۹۰ سانتی‌متری، تاکستان‌های موجود در SMV1 به عنوان کم‌اولویت‌ترین تاکستان‌ها معرفی شدند (Sadeghi *et al.*, 2024).

بررسی پیشینه پژوهشی حاکی از آن است که تنها در یک پژوهش علمی صادقی و همکاران (Sadeghi *et al.*, 2023)، آبخیزهای رده دوم کشور (حوزه‌های آبخیز ۳۰ گانه کشور) از لحاظ سلامت و امنیت بوم‌شناختی در مقیاس ملی با رویکرد PSR اولویت‌بندی شده‌اند. این در حالی است که از سایر رویکردهای اولویت‌بندی از جمله رویکردهای مبتنی بر تئوری بازی، برای اولویت‌بندی آبخیزهای ۳۰ گانه کشور استفاده نشده است. از همین رو، در پژوهش حاضر ارزیابی مقایسه‌ای وضعیت و شرایط عملکردی آبخیزهای رده دوم کشور با استفاده از معیارهای در دسترس ملی با استفاده از الگوریتم Condorcet در تئوری بازی برنامه‌ریزی شده است تا با تکیه بر نتایج آن بتوان آبخیزهای رده دوم کشور با توجه به مقادیر معیارهای در دسترس ملی را اولویت‌بندی کرد. در همین راستا، از آنجایی که در رویکرد Condorcet تئوری بازی، مبنای اولویت‌بندی مقایسه‌های جفتی بین مقادیر معیارهای مطالعاتی است، بر همین اساس، از نظریه بازی و رویکرد Condorcet برای ارزیابی مقایسه‌ای و در نهایت اولویت‌بندی آبخیزهای رده دوم کشور با تکیه بر معیارهای در دسترس ملی استفاده شد. امید است که نتایج این پژوهش سیاست‌گذاران، مدیران و تصمیم‌گیران در مدیریت جامع آبخیزهای کشور و حفظ منابع آب‌و خاک را یاری کنند. اگرچه دستیابی به رویکردهای تفصیلی و اجرایی در مقیاس‌های عملیاتی نیازمند انجام پژوهش‌های گسترده‌تر با مقیاس بزرگ‌تر و در بخش‌ها و یا آبخیزهای با اولویت مدیریتی بالا است.

مواد و روش‌ها منطقه مورد مطالعه

پژوهش حاضر در سطح آبخیزهای رده دوم کشور و در مقیاس ملی انجام گرفته است که در شکل ۱ نشان داده شده است. همان‌طور که مشاهده می‌شود، کشور به ۳۰ آبخیز بزرگ رده دوم تقسیم شده است (سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور، ۱۴۰۲). در جدول ۱ نیز تقسیم‌بندی و مساحت هر کدام از آبخیزهای رده دوم کشور ارائه شده‌اند.

صادقی (Adhami & Sadeghi, 2016) آبخیزهای حوزه گرگان رود و قره‌سو را بر اساس رسوب‌دهی و با استفاده از نظریه بازی اولویت‌بندی کردند. برای این منظور، ۳۸ عامل مستقل در هفت مؤلفه با استفاده از روش تحلیل مؤلفه اصلی^۱ طبقه‌بندی شدند. نتایج استفاده از روش Condorcet برای اولویت‌بندی معیارهای مؤثر نشان دادند که درصد اراضی جنگلی و دبی با ۱۰ سال دوره بازگشت به ترتیب بیش‌ترین و کم‌ترین متغیر تأثیرگذار بر عملکرد رسوب بودند (Adhami & Sadeghi, 2016). در پژوهشی دیگر، با استفاده از نظریه بازی و چارچوب مدیریت مشارکتی^۲ به ارائه سیاست کاربری اراضی پرداختند. در این پژوهش، از نظریه بازی در اولویت‌بندی ۱۳ زیرآبخیز گل‌ازچای واقع در استان آذربایجان غربی و ارائه بهترین شیوه‌های مدیریت مشارکتی استفاده شد. در نهایت، هفت آبخیز دارای اولویت با استفاده از الگوریتم Borda مشخص شدند (Adhami *et al.*, 2018). هم‌چنین، به اولویت‌بندی زیرآبخیزهای تالار در مازندران از دیدگاه فرسایش خاک پرداختند. آنها فرسایش را با استفاده از نسخه اصلاح‌شده معادله جهانی فرسایش خاک^۳ محاسبه و سپس با استفاده از سه رویکرد نظریه بازی Borda، Fallback و Condorcet مناطق دارای فرسایش بالا را اولویت‌بندی کردند (Avand *et al.*, 2023). در پژوهشی دیگر، ضرورت مدیریت بین‌بخشی و بهره‌مندی از اجماع نظر گروداران اصلی با استفاده از رویکردهای نظریه بازی‌ها به منظور اولویت‌بندی آبخیزهای چشمه‌کیله واقع در شهرستان تنکابن بررسی شد. برای اولویت‌بندی آبخیزها از رویکردهای مبتنی بر نظریه بازی‌ها شامل رویکرد Condorcet، امتیازدهی Borda و چانه‌زنی Fallback استفاده شد. نتایج پژوهش نشان دادند که در هر سه رویکرد میزان اختلاف‌نظرها بین دو گروه بهره‌بردار محلی و نهاد سیاست‌گذاری کم‌تر بود و با بخش سازمان اجرایی اختلافات زیادی داشتند (Nasiri Khiavi *et al.*, 2023). صادقی و همکاران (Sadeghi *et al.*, 2023) سلامت و امنیت بوم‌شناسی آبخیزهای اصلی ایران را مورد ارزیابی قرار دادند و نتایج آن‌ها نشان دادند که سلامت آبخیزهای کارون بزرگ و دریاچه نمک در طبقه متوسط با گرایش منفی قرار داشت. در طبقه سلامت متوسط با گرایش مثبت نیز آبخیزهای سفیدرود، مرزی غرب، کرخه، جراحی و زهره، مند، کویر مرکزی و قره‌قوم قرار گرفتند. هم‌چنین، آبخیزهای ارس، دریاچه ارومیه، رودخانه‌های تالش، هراز و قره‌سو، قره‌سو و گرگان، اترک، نمک‌زار خواف، هامون هیرمند، کویر لوت، کویر سیاه‌کوه، گاوخونی، ابرقو سیرجان، طشک‌بختگان مهارلو، هامون جازموریان، بلوچستان جنوبی، کل‌مهران، حله، بندرعباس سدیج و هامون مشکیل در طبقه نسبتاً زیاد با گرایش منفی واقع شدند (Sadeghi *et al.*, 2023). اخیراً نیز صادقی و همکاران از رویکرد Condorcet تئوری بازی برای اولویت‌بندی تاکستان‌های

³ Revised Universal Soil Loss Equation, RUSLE

⁴ Demo Farms

¹ Principal Component Analysis, PCA

² Best Co-Management Practices, BCMPs

C B A. طبق این ساختار، چارچوب ماتریس Condorcet به‌صورت زیر است (Nasiri Khiavi *et al.*, 2023):

$$\begin{bmatrix} A & B & C \\ A & - & B & A \\ B & B & - & B \\ C & A & B & - \end{bmatrix} \quad \text{رابطه (۵)}$$

براساس مقایسه‌های جفتی، برنده در بین تمامی متغیرهای مورد بررسی (O) با تعداد دفعاتی که در ماتریس وجود دارد تعیین می‌شود (Avand *et al.*, 2021). بنا بر این در رابطه ۵، گزینه B بیش‌تر و برنده است.

نتایج و بحث

برای انجام پژوهش حاضر از ۴۴ معیار قابل دسترس در مقیاس ملی در راستای اولویت‌بندی آبخیزهای مورد مطالعه استفاده شد. در همین ارتباط، پس از کمی‌سازی معیارهای نهایی تعیین شده برای این پژوهش، به‌دلیل حذف اثر همبستگی بین متغیرها، با استفاده از آزمون VIF معیارهای دارای همبستگی بالا مشخص شدند که در جدول ۳ ارائه شده‌اند. همان‌طور که مشاهده می‌شود، ۱۸ متغیر دارای مقادیر VIF بیش‌تر از ۱۰ هستند که از روند محاسبات حذف شدند.

کاربست رویکرد نظریه بازی Condorcet برای اولویت‌بندی آبخیزهای رده دوم کشور

پس از نهایی‌سازی معیارهای مطالعاتی، مقادیر معیارها برای هر آبخیز برآورد و سپس این مقادیر نرمال شدند. در ادامه، آبخیزهای رده دوم کشور با استفاده از مقادیر هر یک از معیارهای مطالعاتی به شرح مندرج در جدول ۴ رتبه‌بندی شدند. در همین راستا آبخیزی که بهترین وضعیت را از لحاظ معیار مطالعاتی داشته باشد در رتبه اول و آبخیز با بدترین وضعیت در رتبه آخر قرار گرفتند و این روال برای تمامی معیارهای مطالعاتی مد نظر قرار گرفت. لازم به ذکر است که در جدول ۳ ردیف‌های با رنگ‌های یکسان به‌دلیل وجود مقادیر یکسان برای هر معیار دارای رتبه‌های واحدی هستند. به‌عنوان مثال، در معیار ۸، هر سه آبخیز ۶، ۱۱ و ۷ دارای رتبه ۱ هستند. بر اساس نتایج ارائه شده در جدول ۴، می‌توان دریافت که آبخیزهای ۳۰گانه کشور در بین ۲۶ معیار مطالعاتی حداقل یک‌بار در رتبه‌های اول تا چهارم قرار گرفته‌اند. از طرفی دیگر، آبخیز قره‌سو و گرگان از بین ۲۶ معیار مطالعاتی در چهار معیار مطالعاتی تغذیه آب‌های زیرزمینی، نسبت مساحت طرح‌های اجرا شده به مساحت آبخیز، نسبت مساحت مطالعات انجام‌شده منابع طبیعی به مساحت آبخیز و مقدار فرسایش خاک در رتبه اول قرار گرفته است.

از آنجایی که در آبخیز قره‌سو و گرگان مساحت مطالعات و طرح‌های آبخیزداری نسبت به مساحت آبخیز بیش‌ترین مقدار را دارد، مقدار فرسایش آبخیز مذکور نیز کم‌تر از سایر آبخیزهای مطالعاتی است. از همین‌رو، کارایی مطالعات و اقدامات اجرایی آبخیزداری در کاهش فرسایش خاک به‌وضوح قابل تأیید است. تکا و همکاران (Teka *et al.*, 2020) نیز بیان داشتند که کاربرد رویکرد مدیریت جامع حوزه آبخیز در شمال اتیوپی باعث کاهش

تعیین معیارهای مورد استفاده برای اولویت‌بندی آبخیزهای رده دوم کشور

برای انجام این پژوهش از لایه‌های اطلاعاتی مختلف قابل دسترس و با مقیاس ملی شامل داده‌ها و اطلاعات اقلیمی، انسانی، هیدرولوژی و طبیعی برای اولویت‌بندی آبخیزها استفاده شد. در جدول ۲ متغیرهای تعیین‌شده و روش محاسبه هر کدام ارائه شده‌اند. باتوجه به ماهیت داده‌ها و مقیاس متفاوت آن‌ها و همچنین غیر قابل مقایسه بودن آن‌ها، با استفاده از رابطه‌های (۱) و (۲)، و براساس سرشت معیارها و نوع اثرگذاری آن‌ها بر عملکرد آبخیزها، هم‌مقیاس شدند.

$$X_s = \frac{X_i - X_{\min}}{X_{\max} - X_{\min}} \quad \text{رابطه (۱)}$$

$$X_s = \frac{X_{\max} - X_i}{X_{\max} - X_{\min}} \quad \text{رابطه (۲)}$$

تحلیل میزان اثر معیارهای مطالعاتی

معیارهای مختلف مورد استفاده بنا به سرشت و نوع آن‌ها بعضاً از هم‌بستگی درونی معنی‌داری برخوردار هستند و وجود این هم‌بستگی سبب بروز خطا در محاسبات می‌شود. بر این اساس، در این پژوهش برای شناسایی و حذف معیارهای دارای هم‌بستگی از مجموعه داده‌ها و نقشه‌های ارائه‌شده (<https://drive.google.com/file/d/1bDgUcxpET35lx/view?usp=sharing>) از آزمون عامل تورم واریانس (VIF) استفاده شد. در این آزمون، معیارهای با VIF بیش‌تر از ۱۰ از محاسبات حذف شدند (Sadeghi *et al.*, 2022).

رویکرد نظریه بازی Condorcet

نظریه بازی از چهار بخش اساسی شامل تصمیم‌گیران، گزینه‌های ممکن، انتخاب‌ها و نتایج (منافع) تشکیل شده است. در این روش، بازی‌ها به سازندگان راهبرد اجازه می‌دهند تا در طول زمان از طریق بازی‌های مکرر تکامل یابند و بازیکنان معمولاً قبل از بازی ارتباطی ندارند (Madani, 2010; McKinney & Teasley, 2007). در پژوهش حاضر، از Condorcet رویکرد تئوری بازی برای اولویت‌بندی آبخیزهای رده دوم کشور استفاده شد. رویکرد Condorcet برای تعیین بهترین گزینه در راستای تصمیم‌بینه از روش مقایسه‌های جفتی استفاده می‌کند. در این رویکرد، از رتبه‌بندی ترجیحی و امتیازات صریح هر رأی‌دهنده استفاده می‌کند به‌طوری که هر رأی‌دهنده امتیازات را از کم‌ترین به بیش‌ترین ترجیح خواهد داد. یکی از اهداف اصلی رویکرد Condorcet ایجاد گروه‌هایی بر اساس همه اولویت‌های فردی (i) است (Rivest & Shen, 2010; Sadeghi *et al.*, 2024). یعنی اگر:

$$O_j(A_j, A_k) = 1, \text{ if and only if, } A_j > i. A_k \text{ and } O(A_j) \quad \text{رابطه (۳)}$$

پس اگر رابطه زیر برقرار باشد.


$$O(A_j) = \sum_{i=1}^n O_j(A_j, A_k) \quad \text{رابطه (۴)}$$

ردیف‌های ترجیحی رأی‌دهندگان از بالا به پایین عبارت‌اند از رأی‌دهنده ۱: A B C، رأی‌دهنده ۲: B A C و رأی‌دهنده ۳:

آبخیز، نسبت مساحت دشت‌های ممنوعه به مساحت آبخیز و پوشش گیاهی در مقایسه با غالب آبخیزها وضعیت مناسبی دارد. وضعیت آبخیز تالش در معیارهای نسبت دخالت‌های انسانی به مساحت آبخیز، نسبت مساحت مناطق سیل‌خیز به مساحت آبخیز، تراکم گسل و غلظت کربن مونواکسید خوب نیست و آبخیز رودخانه تالش با توجه به معیارهای مذکور در رتبه‌های آخر قرار گرفته است.

این موضوع نشان می‌دهد که علی‌رغم وضعیت طبیعی مناسب، دخالت‌های انسانی و شیب بالای رودخانه‌ها باعث افزایش خطر سیل و فرسایش شده‌اند و نیاز به برنامه‌های مدیریتی و نظارتی بیشتری در این منطقه حس می‌شود. در بین آبخیزهای مطالعاتی، آبخیز ابرقو و سیرجان از لحاظ معیار نسبت مساحت سیل‌خیز به مساحت آبخیز بهترین وضعیت را دارد. شیب متوسط کم، کم‌بودن میزان دخالت‌های انسانی و اراضی حساس به فرسایش آبخیز ابرقو و سیرجان می‌تواند از دلایل عمده کم بودن مساحت سیل‌خیز نسبت به سایر آبخیزها باشند. از این‌رو، می‌توان پیشنهاد کرد که مناطق با شیب زیاد و تراکم آبراهه بالا به‌منظور کاهش سیل‌خیزی تحت اقدامات حفاظتی بیشتر قرار گیرند.

۵۰ درصدی فرسایش شد. علاوه بر این، بهره‌وری محصول، دسترسی به آب (آبیاری و خانگی) و دسترسی به علوفه به‌ترتیب ۳۳، ۲۲ و ۱۰ درصد افزایش یافتند (Teka *et al.*, 2020). از سوی دیگر، درآمد خانوار نیز پس از اجرای اقدامات آبخیزداری ۵۶ درصد افزایش یافت. از آنجایی که مساحت مناطق با فرسایش زیاد در آبخیز قره‌سو و گرگان همچنان بیشتر از سایر آبخیزها است، پیشنهاد می‌شود که برنامه‌های مدیریتی ویژه‌ای برای کاهش مساحت مناطق با فرسایش زیاد تدوین و اجرا شوند. این اقدامات می‌توانند شامل تقویت پوشش گیاهی، اجرای طرح‌های آبخیزداری و بهبود زیرساخت‌های محلی باشند. در همین ارتباط، آبخیز جراحی و زهره دارای کم‌ترین نسبت مساحت مناطق با فرسایش زیاد در بین آبخیزهای مطالعاتی است. این در حالی است که این آبخیز از لحاظ تراکم زهکشی، فرسایش ویژه و تراکم آبراهه‌های با رتبه چهار وضعیت خوبی ندارد. بنا بر این، در آبخیز مربوطه توجه به سایر عوامل مهم از جمله تراکم آبراهه‌ها و فرسایش ویژه برای بهبود وضعیت کلی منطقه ضروری است. آبخیز رودخانه‌های تالش نیز در معیارهای اختلاف دما، نسبت مساحت با فرسایش زیاد به مساحت



شکل ۱- نمای کلی از حوزه‌های آبخیز رده دوم کشور

Figure 1. An overview of Iran's Second-Order Watersheds

جدول ۱- فهرست حوزه‌های آبخیز رده دوم ایران

Table 1. The list of Iran's Second-Order Watersheds

کد	حوزه آبخیز رده دوم	مساحت (کیلومتر مربع)	کد	حوزه آبخیز رده دوم	مساحت (کیلومتر مربع)
Code	Second-Order Watersheds	Area (km ²)	Code	Second-Order Watersheds	Area (km ²)
1	حوزه آبخیز کویر ابرقو - سیرجان Abarghou- Sirjan Desert Watershed	58030	16	حوزه آبخیز رودخانه کارون بزرگ Large Karoon River Watershed	66248
2	حوزه آبخیز رودخانه اترک Atrak River Watershed	26766	17	حوزه آبخیز رودخانه کرخه Karkheh River Watershed	51796
3	حوزه آبخیز رودخانه ارس Aras river watershed	39900	18	حوزه آبخیز رودخانه‌های کل، مهران و مسیل‌های جنوبی و جزایر Kal, Mehran, and southern rivers Watershed	61880
4	حوزه آبخیز رودخانه‌های بلوچستان جنوبی بین سدج و مرز پاکستان Southern Balochistan and Pakistan Border Watershed	49113	19	حوزه آبخیز کویرهای درانجیر و ساغر Daranjir and Saghar Desert Watershed	50478
5	سدج Bandar Abbas and Sedij Border Watershed	45159	20	حوزه آبخیز کویرهای سیاه‌کوه، ریگ زرین و دق سرخ Siahkooch, Righ Zarin, and Dagh Sorkh Desert Watershed	48771
6	حوزه آبخیز جراحی و زهره Jarahi and Zohreh Watershed	40717	21	حوزه آبخیز کویر لوت Lut Desert Watershed	206035
7	طرف آن Halleh watershed and small rivers on both sides of it	21308	22	حوزه آبخیز کویر مرکزی Central Desert Watershed	226336
8	حوزه آبخیز دریاچه ارومیه Lake Urmia watershed	52020	23	حوزه آبخیز گاوخونی Gavkhooni Watershed	41464
9	حوزه آبخیز دریاچه نمک Salt Lake watershed	92475	24	حوزه آبخیز رودخانه‌های مرزی غرب Western Border Rivers Watershed	39618
10	حوزه آبخیز رودخانه‌های بین سفیدرود و هراز Sefidroud and Haraz Watershed	10933	25	حوزه آبخیز رودخانه مند و حوزه‌های بسته هرم، کاریان و خنج Mand River and Heram, Karian, and Khanj closed watersheds	47753
11	حوزه آبخیز رودخانه‌های تالش - مرداب انزلی Tashk-Bakhtegan and Maharlo Lakes Watershed	6704	26	حوزه آبخیز دق پترگان - نمک‌زار خواف Degh-Petergan-Khaf Salt Marsh Watershed	32882
12	حوزه آبخیز سفیدرود Sefidroud Watershed	59244	27	حوزه آبخیز هامون و جازموریان Hamoon and Jazmoorian Watershed	69854
13	حوزه آبخیز دریاچه‌های طشک - بختگان و مه‌ارلو Tashk-Bakhtegan and Maharlo Lakes	31567	28	حوزه آبخیز هامون مشکیل Hamoon-Mashkil Watershed	36640
14	حوزه آبخیز رودخانه‌های قره‌سو و گرگان Qarehsou and Gorgan Watershed	13151	29	حوزه آبخیز هامون هیرمند گودرزه " Hamoon Hirmand (Goodarzeh) Watershed	33714
15	حوزه آبخیز قره‌قوم Qarehqom Watershed	43986	30	حوزه آبخیز رودخانه هراز و رودخانه‌های بین هراز و قره‌سو The watershed of Haraz River and the rivers between Haraz and Qarasu	18348

جدول ۲- معیارها و شاخص‌های اولیه در ارزیابی اولویت‌بندی جامع حوزه‌های آبخیز رده دو ایران

Figure 2. Primary criteria and indicators in the evaluation of the comprehensive prioritization of Iran's Second-Order Watersheds

متغیر	منبع یا روش محاسبه	متغیر	منبع یا روش محاسبه
Variable	Reference or method of calculation	Variable	Reference or method of calculation
زمین‌های تحت تأثیر سرمایه‌گذاری ملی	نقشه کاربری اراضی ایران	ارتفاع	نقشه ۳۰ متری مدل رقومی ارتفاع
Lands affected by national investment	Land-use map of Iran	Height difference	Digital elevation model map30 meter
مساحت دشت‌های ممنوعه به سطح آبخیز	سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (۱۴۰۲)	شیب متوسط	نقشه ۳۰ متری مدل رقومی ارتفاع
The area of the forbidden plains to the watershed level	Iran's Natural Resources and Watershed Organization (2023)	Moderate slope	Digital elevation model map30 meter
نسبت اراضی حساس به فرسایش به سطح آبخیز	سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (۱۴۰۲)	اختلاف دمای کمینه و بیشینه	سازمان هواشناسی ایران (۱۳۷۰-۱۴۰۰)
The ratio of land sensitive to erosion to watershed surface	Iran's Natural Resources and Watershed Organization (2023)	Minimum and maximum temperature difference	Iran Meteorological Organization (1991-2020)
نسبت اراضی سیل‌خیز به سطح آبخیز	سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (۱۴۰۲)	شاخص تفاوت پوشش گیاهی نرمال شده	محصولات MODIS et al. (2022) Lunetta
The ratio of flood-prone lands to watershed surface	Iran's Natural Resources and Watershed Organization (2023)	شش‌ماهه دوره غالب بارش در کشور	Normalized vegetation cover difference index for six months of the predominant rainfall period in the country
تراکم گسل	Sadeghi et al. (2018a)	شاخص فرسایش باران	Sadeghi and Hazbavi (2017) Sadeghi and Tavangar (2015) Sadeghi et al. (2018a)
Fault density		Rain erosion index	
عمق آب سطحی معادل	محصولات NASA	متوسط تبخیر و تعرق سالانه	سازمان هواشناسی ایران (۱۳۷۰-۱۴۰۰)
Equivalent surface water depth	Banerjee and Kumar (2018)	Average annual evapotranspiration	Iran Meteorological Organization (1991-2020)
میزان برداشت انسان از آب‌های زیرزمینی	Ashraf et al. (2021)	تراکم جاده	Sadeghi et al. (2018a)
The amount of human withdrawal from underground water		Road congestion	
مهاجرت	مرکز آمار ایران	تقاطع جاده با آبراهه	همپوشانی جاده و آبراهه
Migration	Statistical Center of Iran	The intersection of the road and the waterway	Overlap of road and waterway

ادامه جدول ۲- معیارها و شاخص‌های اولیه در ارزیابی اولویت‌بندی جامع حوزه‌های آبخیز رده دو ایران

Figure 2. Continued. Primary criteria and indicators in the evaluation of the comprehensive prioritization of Iran's Second-Order Watersheds

منبع یا روش محاسبه Reference or the method of calculation	متغیر Variable	منبع یا روش محاسبه Reference or the method of calculation	متغیر Variable
تقسیم وسعت مناطق مطالعه‌شده به مساحت آبخیز (Ashraf <i>et al.</i> , 2021) Dividing the size of the studied areas into watershed area (Ashraf <i>et al.</i> , 2021)	حجم تغذیه آب زیرزمینی Groundwater supply volume	سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (۱۴۰۲) Iran's Natural Resources and Watershed Organization (2023)	نسبت مساحت مناطق مطالعه‌شده به مساحت حوزه آبخیز The ratio of the area of the studied areas to the area of the watershed
تقسیم وسعت مناطق تحت پوشش اقدامات به مساحت آبخیز (Ashraf <i>et al.</i> , 2021) Dividing the size of the studied areas into watershed area (Ashraf <i>et al.</i> , 2021)	میزان افت سطح آب زیرزمینی The amount of groundwater level drop	سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (۱۴۰۲) Iran's Natural Resources and Watershed Organization (2023)	نسبت مساحت پروژه‌های اجراشده به مساحت حوزه آبخیز The ratio of the area of implemented projects to the area of the watershed
سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور (۱۴۰۲) Iran's Natural Resources and Watershed Organization (2023)	نسبت اراضی با فرسایش زیاد به سطح آبخیز The ratio of lands with high erosion to watershed surface	نقشه ۳۰ متری مدل رقومی ارتفاع Meter-high digital model map-30	تراکم زهکشی Drainage density
Ashraf <i>et al.</i> (2021)	تغییرات آب زیرزمینی Groundwater changes	Vafakhah <i>et al.</i> (2023)	شیب تغییرات دبی The slope of the flow changes
Sadeghi <i>et al.</i> (2023)	شاخص طبیعت‌گرایی Naturalism index	Ashraf <i>et al.</i> (2021)	شوری آب زیرزمینی Groundwater salinity
محصولات MODIS Abatzoglou <i>et al.</i> (2018)	شاخص خشکسالی Palmer drought index	مرکز آمار ایران (۱۳۹۵) Iran Statistics Center (2016)	تراکم جمعیت Population density
محصولات MODIS (۱۴۰۲) MODIS products Liang <i>et al.</i> (2015)	تداوم گرد و غبار Continuity of dust		شاخص تکه‌تکه شدگی Fragmentation index
محصولات Sentinel et al. (2018) Borsdorff	غلظت مونواکسید کربن Carbon monoxide concentration		شاخص تجمع Aggregation index
			شاخص بزرگترین لکه Index of the largest stain
			شاخص سرایت Contagion index
		محصولات MODIS Liang <i>et al.</i> (2015)	شاخص تداخل Interference index
			شاخص تنوع شانون Shannon diversity index
محصولات Sentinel Petetin <i>et al.</i> (2023)	غلظت دی‌اکسید نیتروژن Nitrogen dioxide concentration	محصولات MODIS Liang <i>et al.</i> (2015)	شاخص یکنواختی شانون Shannon uniformity index
			شاخص پیوستگی Continuity index
			شاخص تعداد لکه Spot number index

جدول ۳- مقادیر VIF معیارهای مورد استفاده برای اولویت‌بندی آبخیزهای رده دوم کشور

Table 3. VIF values of the criteria used to prioritize Iran's Second-Order Watersheds

VIF	متغیر Variable	VIF	متغیر Variable
2.13	تغذیه آب‌های زیرزمینی Groundwater feeding	4.08	شاخص فرسایش باران Rain erosion index
3.94	نسبت مساحت منطقه سیل‌خیز به مساحت آبخیز The ratio of the area of the flood zone to the area of the watershed	12.88	شیب متوسط Moderate slope
3.39	نسبت مساحت با فرسایش زیاد به مساحت آبخیز The ratio of the area with high erosion to the watershed area	2.77	اختلاف ارتفاع کمینه و بیشینه Minimum and maximum height difference
63.43	شاخص پوشش گیاهی نرمال‌شده Normalized vegetation cover index	2.05	تراکم جاده Road density
3.11	شاخص پوشش گیاهی نرمال‌شده شش‌ماهه دوره غالب بارش در کشور The normalized vegetation cover index of six months of the dominant rainfall period in the country	1.37	نسبت اراضی حساس به فرسایش Proportion of land sensitive to erosion
1.79	جمعیت population	54.67	بارندگی Rainfall
3.38	تراکم گسل Fault density	7.27	اختلاف دما Temperature difference
23.90	غلظت دی‌اکسید نیتروژن (میکرومول بر مترمربع) Nitrogen dioxide concentration (micromol/m ²)	6.43	تراکم زهکشی Drainage density
6.00	غلظت مونواکسید کربن (میکرومول بر مترمربع) Carbon monoxide concentration (micromole per square meter)	8.69	تراکم آبراهه با رتبه ۴ Drainage density with fourth -Order
15.73	شاخص عمق نوری هواویز Air depth indicator	7.91	مساحت مناطق حفاظت شده Area of protected regions
15.14	تعداد لکه Number of spots	69.25	تراکم جمعیت Population density
105.56	شاخص بزرگ‌ترین لکه Index of the largest spot	17.89	تغییرات ذخیره آب زیر زمینی Changes in ground water storage
2931.00	شاخص سرایت Contagion index	3.38	نسبت مساحت دخالت انسانی به سطح آبخیز The ratio of the area of human interference to the surface of the watershed

ادامه جدول ۳- مقادیر VIF معیارهای مورد استفاده برای اولویت‌بندی آبخیزهای رده دوم کشور

Table 3. Continued. VIF values of the criteria used to prioritize Iran's Second-Order Watersheds

VIF	متغیر Variable	VIF	متغیر Variable
100.71	شاخص تداخل Interference index	9.86	شاخص طبیعت‌گرایی Naturalism index
176.45	شاخص پیوستگی Continuity index	6.49	نسبت مساحت دشت‌های ممنوعه به مساحت آبخیز The ratio of the area of the forbidden plains to the area of the watershed
165.50	شاخص تکه‌تکه‌شدگی Fragmentation index	4.66	فرسایش ویژه Special erosion
127.43	شاخص تنوع شانون Shannon diversity index	7.60	شاخص خشک‌سالی Palmer Palmer drought index
1617.00	شاخص یکنواختی شانون Shannon uniformity index	19.52	رطوبت سطحی Surface moisture
420.13	شاخص تراکم لکه Spot density index	12.47	شاخص شوری Salinity index
1.21	فرسایش خاک Soil erosion	960.30	شاخص تجمع Aggregation index
2.12	نسبت مساحت طرح‌های اجرا شده به مساحت آبخیز The ratio of the area of implemented projects to the area of the watershed	1.30	میزان جمعیت اضافه شده به هر آبخیز The amount of population added to each watershed
1.96	نسبت مساحت مطالعات انجام‌شده منابع طبیعی به مساحت آبخیز The ratio of the area of natural resources studies to the watershed area	1.32	برداشت انسانی از منابع آب زیرزمینی Human extraction of groundwater resources

(Tafangchi Mahyari *et al.*, 2021) بیان داشتند که ویژگی‌های جمعی و فردی توسعه، درآمد رفاه و امنیت اجتماعی و تنوع امکانات شهری و قومیت‌ها بیش‌ترین تأثیر را بر نرخ خالص مهاجرت در کشور در دوره ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۵ داشتند.

بررسی وضعیت کویرهای چهارگانه کشور نشان می‌دهد که اگرچه این کویرها از لحاظ شرایط اقلیمی و بوم‌شناسی شباهت‌های بسیاری دارند، اما از نظر شاخص‌های مختلف مدیریتی و زیست‌محیطی تفاوت‌هایی اساسی بین آن‌ها وجود دارند. در این بین، کویر درانجیر و کویر لوت نسبت به کویرهای سیاه‌کوه و مرکزی شرایط بهتری دارند. به‌طور خاص، در کویر درانجیر شاخص‌هایی چون طبیعت‌گرایی، تغذیه آب‌های زیرزمینی، غلظت کربن منوکسید، تراکم آبراهه‌های با رتبه ۴، مهاجرت، فرسایش ویژه، جمعیت و جریان خروجی انسانی، در مقایسه با دیگر زیرآبخیزها وضعیت مطلوب‌تری را نشان می‌دهند. با این حال، اختلاف دمای بالا در این کویر می‌تواند از چالش‌های عمده در مدیریت محیط زیستی این منطقه باشد. در کویر لوت نیز وضعیت مشابهی مشاهده می‌شود، با این تفاوت که در معیارهای مختلفی همچون نسبت طرح‌های اجرا شده به مساحت آبخیز، نسبت مساحت مطالعات منابع طبیعی به مساحت آبخیز، فرسایش و اختلاف دما، وضعیت نسبت به کویر درانجیر کمی نامطلوب‌تر است.

در خصوص کویر سیاه‌کوه، اگرچه نسبت اراضی حساس به فرسایش در این کویر کمتر از دیگر آبخیزها است، اما میزان فرسایش خاک تنها از هفت آبخیز کمتر است. این مسئله نشان‌دهنده اهمیت بیشتر اقداماتی همچون کاهش فعالیت‌های انسانی، مدیریت جاده‌ها و بهبود طرح‌های آبخیزداری است. همچنین، در این منطقه مشکلاتی چون کمبود مناطق حفاظت‌شده، تراکم جاده‌ها، و ضعف در تغذیه آب‌های زیرزمینی و زهکشی مشاهده می‌شوند که در صورت عدم مدیریت صحیح می‌توانند به تشدید فرسایش خاک و تخریب محیط زیست منجر شوند. از سوی دیگر، کویر مرکزی در معیارهای مختلفی همچون تبخیر، نسبت مساحت دخالت انسانی به سطح آبخیز، فرسایش ویژه و شاخص طبیعت‌گرایی وضعیت نسبتاً مناسبی دارد. با این حال، در معیارهای دیگری مانند اختلاف ارتفاع کمینه و بیشینه، جمعیت، مساحت مناطق حفاظت‌شده، مهاجرت و مطالعات منابع طبیعی، شرایط این کویر نامناسب است. به‌نظر می‌رسد که بهبود شرایط در

بررسی معیارهای مطالعاتی حاکی از آن بود که کم‌ترین میزان فرسایش‌دگی باران به آبخیز هامون و مشکل تعلق داشت. در همین ارتباط، وضعیت این آبخیز براساس معیارهای میزان جمعیت، مساحت مناطق حفاظت‌شده، شاخص طبیعت‌گرایی و شاخص خشک‌سالی پالمر نسبت به غالب آبخیزهای کشور از وضعیت بهتری برخوردار است. با این وجود، علی‌رغم بالا بودن مساحت مناطق حفاظت‌شده و شاخص طبیعت‌گرایی، میزان فرسایش و نسبت مساحت سیل‌خیز به مساحت منطقه در این آبخیز بالا است. از آنجایی که مطالعات مرتبط با منابع طبیعی نیز در این آبخیز بسیار کم هستند، برهمین اساس افزایش مطالعات و اقدامات اجرایی در آبخیز هامون و مشکل در کاهش فرسایش خاک و مساحت مناطق سیل‌خیز ضروری به‌نظر می‌رسد. بررسی وضعیت هامون هیرمند و هامون جازموریان بر اساس معیارهای مطالعاتی نشان می‌دهد که وضعیت هامون هیرمند در غالب معیارهای مطالعاتی از هامون مشکل و هامون جازموریان بهتر است. در همین ارتباط، وضعیت این آبخیز از لحاظ معیارهای جمعیت، تراکم آبراهه، جاده و آبراهه‌های با رتبه ۴ و فرسایش‌دگی باران بسیار خوب است و در رتبه‌بندی آبخیزهای مطالعاتی، آبخیز هامون و هیرمند از لحاظ معیارهای مذکور در رتبه‌های یک تا شش قرار گرفته است. آبخیز بلوچستان جنوبی نیز در مجاورت آبخیز هامون و مشکل قرار گرفته است. از همین‌رو، بررسی مقادیر ۲۶ معیار مطالعاتی در آبخیز بلوچستان جنوبی نشان می‌دهد که میزان تبخیر و وسعت دشت‌های ممنوعه در این آبخیز نسبت به سایر آبخیزها کم است. شاخص طبیعت‌گرایی، تراکم آبراهه‌های با رتبه ۴ و همچنین میزان جمعیت در این منطقه در مقایسه با اکثر آبخیزها وضعیت بهتری دارند. از سوی دیگر، میزان مهاجرت آبخیز بلوچستان جنوبی فقط از آبخیزهای هامون مشکل، هامون هیرمند و کویر درانجیر بیش‌تر است. با این حال، جریان خروجی انسانی، تراکم جاده و گسل، میزان فرسایش و غلظت گاز کربن مونواکسید در این آبخیز بالا هستند. وجود بنادر، تردد کشتی‌ها و وسایل ترابری در آبخیز مذکور می‌تواند دلیلی بر غلظت بالای گاز مونواکسید کربن باشد. همچنین، نسبت مساحت مطالعات و طرح‌های انجام شده در این آبخیز از غالب آبخیزهای مطالعاتی کم‌تر است. از همین‌رو، انتظار می‌رود که با افزایش مطالعات و اجرای طرح‌های مرتبط با منابع طبیعی، فرسایش خاک کاهش یابد. همچنین، با افزایش سطح درآمد و امنیت اجتماعی خانوار از جریان خروجی انسانی در منطقه کاسته شود. در همین راستا، تافنگچی مهبیاری و همکاران

بر همین اساس، شناخت اثرات مختلف تغییر در کاربری اراضی در آبخیزهای مذکور می‌تواند راهگشای مشکلات بسیاری باشد (Masoomi *et al.*, 2020). علاوه بر تغییرات کاربری اراضی، تغییرات کاهشی ذخیره آب زیرزمینی در نتیجه برداشت بی‌رویه آب به‌خصوص در آبخیزهای قره قوم، کرخه، مرزی غرب، کارون بزرگ، جراحی و زهره، حله و دریاچه نمک سبب افت معنی‌دار در سطح آب‌های زیرزمینی خواهند شد (Akbarzadeh & Nikoo, 2022). باگذشت زمان و ادامه شرایط موجود، سطوح آبی و دریاچه‌های موجود در آبخیزها خشک می‌شوند و ارائه خدمات مختلف آن‌ها در کم‌ترین حالت ممکن خواهد بود. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که معیارهای مختلف به‌خصوص عوامل اقلیمی و انسانی اثرات مخرب زیادی بر خدمات بوم‌سازگان و همچنین عملکرد آن‌ها داشته‌اند. از آن جایی که زمین جزو منابع تجدیدناپذیر است، دسترسی عادلانه به آن و ارائه راهکارهای اصولی در راستای توسعه پایدار امری ضروری و اجتناب‌ناپذیر تلقی می‌شود (Faal Jalali *et al.*, 2021).

این منطقه نیازمند توجه ویژه به تقویت طرح‌های اجرایی حفاظت منابع طبیعی و مدیریت بهینه آبخیزداری باشد. پس از رتبه‌بندی آبخیزهای رده دو کشور در هر یک از معیارها، اولویت‌بندی آبخیزهای مذکور با استفاده از رویکرد Condorcet تئوری بازی صورت پذیرفت. امتیاز و اولویت آبخیزهای مطالعاتی در جدول ۶ ارائه شده‌اند. بر اساس جدول ۵، آبخیز جراحی و زهره با ۳ امتیاز کم‌ترین و آبخیز کویردرانجیر با ۵۴ امتیاز بیش‌ترین امتیاز را به خود اختصاص داده‌اند. در این روش، هرچه امتیاز کسب‌شده کم‌تر باشد، شرایط آن آبخیز وخیم‌تر است. لذا همان طور که در جدول ۵ نیز ارائه شده است، آبخیز جراحی و زهره بدترین شرایط را دارد. آبخیز کویر درانجیر از بهترین شرایط برخوردار است. بررسی‌های انجام شده در پژوهش صادقی و همکاران (Sadeghi *et al.*, 2023) در ارزیابی سلامت آبخیزهای رده دوم کشور نیز نشان می‌دهند که آبخیز درانجیر دارای فشار کم نسبت به سایر آبخیزها است. میزان سلامت آبخیز مذکور نیز نسبتاً زیاد تعیین شده است که نتایج پژوهش حاضر را تأیید می‌کند.

جدول ۴- رتبه‌بندی آبخیزهای ۳۰ گانه کشور براساس مقادیر معیارهای مطالعاتی

Table 4. Ranking of 30 watersheds of the country based on the values of the study criteria

Watershed	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
حوزه آبخیز	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
1	30	29	28	*	26	25	1	1	1	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	1	9	1	7	1	5	4	1	2	*
2	30	29	*	2	2	2	24	23	1	21	20	19	2	17	16	2	14	13	2	11	10	9	2	*	2	*	*	*	2	2
3	30	29	28	3	26	25	24	23	3	21	20	19	3	17	16	3	14	13	12	11	10	9	3	7	3	3	2	*	3	1
4	4	29	28	27	26	25	*	4	4	21	4	19	18	4	4	15	*	*	12	4	*	9	8	4	4	4	*	3	2	4
5	5	29	28	*	*	5	24	5	5	21	5	19	18	17	*	15	14	*	12	11	10	9	8	7	5	*	4	3	*	5
6	30	29	28	27	26	25	24	23	*	21	20	19	18	17	*	15	14	13	12	11	10	9	*	7	*	5	4	3	2	1
7	30	29	28	7	*	7	24	7	7	21	20	19	18	17	*	7	14	7	7	11	7	9	7	*	7	7	4	7	*	7
8	30	*	28	8	*	25	24	23	8	21	*	19	18	17	16	8	14	13	12	11	10	*	*	7	*	8	8	3	2	1
9	30	29	28	9	9	9	9	9	22	21	9	19	18	17	9	15	14	13	9	*	10	*	*	9	9	9	9	9	9	9
10	30	29	28	10	26	25	*	10	10	21	*	19	*	*	10	10	14	10	10	*	*	10	10	7	10	10	*	10	10	1
11	30	29	*	*	*	11	11	11	11	21	11	19	11	17	11	11	14	11	11	*	*	*	11	11	11	11	4	11	11	11
12	30	29	12	12	26	25	24	23	12	21	12	19	18	17	16	15	14	13	*	11	10	9	12	7	12	12	12	12	2	12
13	13	29	28	13	13	13	13	13	*	21	13	19	18	17	13	13	14	*	13	11	10	13	13	7	13	*	*	13	14	13
14	14	29	28	14	14	14	14	14	14	21	14	19	18	14	14	14	*	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	30	15	28	15	26	15	*	23	15	21	15	19	*	17	16	*	14	13	15	11	10	15	8	7	15	15	15	3	2	15
16	30	29	*	16	16	16	24	23	16	21	16	19	18	17	*	16	14	13	16	11	10	9	16	*	*	*	4	16	16	16
17	30	29	*	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	*	17	14	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	18	*	28	*	18	18	*	18	18	18	18	19	*	18	18	*	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	3	2
19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	*	19	17	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	30	29	28	20	26	20	*	20	22	21	*	19	18	17	16	15	14	13	12	11	*	9	*	20	20	5	4	20	20	20
21	21	28	21	21	21	21	21	21	21	*	21	21	18	17	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21	21
22	30	29	28	27	26	25	24	23	*	21	22	19	18	17	16	15	14	*	12	11	10	22	8	7	*	5	4	3	1	1
23	23	29	28	23	26	23	*	23	21	20	19	18	17	23	23	14	13	23	11	10	9	23	7	23	5	4	23	24	1	23
24	30	24	28	24	26	24	*	24	21	*	19	*	17	24	*	14	13	24	11	*	9	24	24	24	24	*	24	24	1	24
25	30	29	28	25	25	*	24	23	25	21	20	19	18	17	16	15	14	13	25	11	25	9	25	7	25	5	25	25	2	25
26	30	29	28	26	*	25	26	26	26	21	26	19	18	17	16	26	14	13	26	*	26	9	*	*	26	*	26	26	2	26
27	30	29	28	*	26	25	24	23	27	21	20	19	*	17	16	15	14	13	12	*	10	9	8	7	27	*	27	3	2	*
28	28	28	*	28	28	28	28	28	28	28	19	28	*	*	28	28	28	28	12	*	28	28	28	28	28	28	28	28	*	28
29	29	*	28	29	29	28	28	28	28	29	21	29	19	*	29	15	29	29	29	29	29	29	*	29	29	29	29	29	29	29
30	*	29	28	30	30	30	30	30	30	21	30	19	18	30	30	15	14	13	30	30	30	30	30	30	30	30	5	4	30	30

Note: Color cells with stars have similar ranking.

راهنما: سلول‌های رنگی و با علامت ستاره از امتیاز مساوی در اولویت‌بندی برخوردار بودند.

در جنوب، آبخیزهای کویر مرکزی و ابرقو سیرجان در مرکز و آبخیزهای دریاچه ارومیه، سفیدرود و ارس در شمال‌غربی در مقایسه با سایر آبخیزها ضعیف هستند و باید بیش‌تر مورد توجه قرار گیرند. نتایج نشان می‌دهند که آبخیزهای مطالعاتی در این اولویت‌بندی شامل مناطقی با ویژگی‌های بوم‌شناسی و انسانی متفاوت هستند. از این‌رو، مدیریت یکسان و عمومی برای تمامی این آبخیزها ممکن است نه تنها ناکارآمد، بلکه منجر به افزایش مشکلات و چالش‌ها در برخی مناطق شود. به‌عنوان مثال، در

نتایج پژوهش حاضر می‌تواند به‌عنوان پیش‌نیازی در شناسایی معیارهای اثرگذار و انتخاب رویکردهای مدیریتی متناسب با آن‌ها برای کاهش اثرات تخریبی در آبخیزهای رده دوم کشور در اختیار مدیران و بخش‌های مربوطه قرار گیرند. اولویت‌بندی آبخیزهای رده دوم کشور در شکل ۲ ارائه شده است. براساس نتایج حاصل از شکل ۲، می‌توان دریافت که با توجه به معیارهای مطالعاتی وضعیت و شرایط عملکردی آبخیز جراحی و زهره در جنوب‌غربی، آبخیز هامون جازموریان در جنوب‌شرقی، آبخیز بندرعباس-سدیج

برای افزایش بهره‌وری آب باشد. در مقابل، در مناطقی با فشارهای انسانی بالا، نظیر رودخانه‌های تالش و سفیدرود، نیاز به رویکردهای مدیریتی جامع و یکپارچه برای کنترل و کاهش آثار مخرب مداخلات انسانی (همچون تغییرات در کاربری اراضی) و حفظ تعادل بوم‌شناسی ضروری است.

آبخیزهایی که با کمبود منابع آبی مواجه هستند، مانند آبخیزهای دریاچه ارومیه، ارس و سفیدرود، رویکردهای مبتنی بر حفظ و مدیریت منابع آبی، استفاده بهینه از آب و کاهش تأثیرات خشکسالی باید در اولویت قرار گیرند. در همین راستا، یکی از راه‌حل‌های کلیدی می‌تواند تقویت طرح‌های احیای منابع آب زیرزمینی، کاهش مصرف بی‌رویه آب و استفاده از فناوری‌های نوین در کشاورزی

جدول ۵- مقادیر امتیاز و اولویت آبخیزهای رده دوم کشور با استفاده از رویکرد Condorcet

Table 5. Values and priority values of Iran's Second-Order Watersheds using the Condorcet approach

اولویت Priority	امتیاز Score	حوزه آبخیز Watershed	اولویت Priority	امتیاز Score	حوزه آبخیز Watershed
16	28	حوزه آبخیز خواف Khaf Watershed	1	3	حوزه آبخیز جراحی و زهره Jarahi and Zohreh Watershed
17	29	حوزه آبخیز حله Helleh River Watershed	2	6	حوزه آبخیز مرکزی Central Desert Watershed
18	30	حوزه آبخیز مرز غربی Western Border Rivers Watershed	3	10	حوزه آبخیز هامون و جازموریان Hamoon and Jazmoorian Watershed
19	31	حوزه آبخیز سفیدرود و هزار Sefidroud and Haraz Watershed	4	15	حوزه آبخیز ابرقو-سیرجان Abarghou- Sirjan Desert Watershed
20	32	حوزه آبخیز دریاچه نمک Salt Lake Watershed	5	15	حوزه آبخیز دریاچه ارومیه Urmia Lake Watershed
21	35	حوزه آبخیز تشت-بختگان و مهارلو Tashk-Bakhtegan and Maharlo Lakes Watershed	6	18	حوزه آبخیز ارس Aras River Watershed
22	38	حوزه آبخیز هزار و قره سو Haraz and Qarehsou Watershed	7	19	حوزه آبخیز بندرعباس و سدج Watershed Bandar Abbas and Sedij Border
23	39	حوزه آبخیز تالش Talesh-Mordab Anzali Rivers Watershed	8	19	حوزه آبخیز سیاهکوه Sorkh Desert Siakhkoo, Riqeh Zarin, and Dagh Watershed
24	43	حوزه آبخیز کل-مهران Watershed Kal, Mehran, and southern rivers	9	20	حوزه آبخیز سفیدرود Sefidroud Watershed
25	46	حوزه آبخیز کرخه Karkheh River Watershed	10	20	حوزه آبخیز مند و مهران Mand River and Heram, Karian, and watersheds
26	46	حوزه آبخیز هامون هیرمند Hamoon Hirmand (Goodarzeh) Watershed	11	23	حوزه آبخیز اترک Atrak River Watershed
27	47	حوزه آبخیز گرگان و قره‌سو Qarehsou and Gorgan Watershed	12	23	حوزه آبخیز گاوخونی Gavkhouni Watershed
28	49	حوزه آبخیز هامون مشکیل Hamoon-Mashkil Watershed	13	24	حوزه آبخیز قره‌قوم Qarehqom Watershed
29	50	حوزه آبخیز کویر لوت Lut Desert Watershed	14	26	آبخیز مرزی بلوچستان جنوبی و پاکستان Border Watershed Southern Balochistan and Pakistan
30	54	حوزه آبخیز درانجیر Daranjir and Saghar Desert Watershed	15	26	حوزه آبخیز کارون بزرگ Large Karoon River Watershed


نتیجه‌گیری کلی

پژوهش حاضر باهدف اولویت‌بندی آبخیزهای رده دوم کشور با کاربست یکی از رویکردهای تئوری بازی و به‌منظور ارائه تصویری کلیدی درعین حال جامع و مبتنی بر حداکثر داده‌های قابل احصا در مقیاس کشوری و برای اولین بار صورت گرفت. برای انجام این کار از ۴۴ متغیر در شاخص‌های مختلف استفاده شد که پس از تعیین استقلال متغیرها از یکدیگر، ۲۶ متغیر برای اولویت‌بندی مقایسه‌ای آبخیزهای رده دوم کشور مورد استفاده قرار گرفتند. لازم به ذکر است که برای ارزیابی نتایج نیز از پژوهش‌های صورت گرفته در مقیاس ملی استفاده شد. نتایج اولویت‌بندی مقایسه‌ای حاکی از آن هستند که در مجموع ۲۶ معیار مطالعاتی، آبخیز جراحی و زهره با امتیاز ۳ در بدترین و آبخیز کویر درانجیر با امتیاز ۵۴ در بهترین شرایط ممکن قرار دارند. لازم به ذکر است که در پژوهش حاضر از مجموعه متغیرهای تأثیرگذار و در دسترس در آبخیزها برای اولویت‌بندی آن‌ها استفاده شده است. با توجه به این که مبنای مقایسه در رویکرد Condorcet مقایسه‌های جفتی است، بنا بر این زیرآبخیزهای جراحی و زهره و کویر درانجیر زیرآبخیزهایی هستند که در مقایسه‌های جفتی بین سایر زیرآبخیزها در معیارهای مذکور، به ترتیب بیش‌ترین و کم‌ترین باخت را تجربه کرده‌اند. براین اساس، نتایج اولویت‌بندی زمانی قابل اعتماد خواهند بود

تغییر در رخدادهای اقلیمی، کاهش بارندگی و خشکسالی‌ها در آبخیزهایی مانند دریاچه ارومیه، ارس و سفیدرود می‌توانند تبعات متعددی در کاهش و خشکیدگی منابع آبی آبخیزهای مربوطه داشته باشند (Ahmadi *et al.*, 2021). همچنین، تغییر در کاربری/پوشش اراضی و افزایش مداخلات انسانی در آبخیزهایی مانند رودخانه‌های تالش، دریاچه ارومیه، سفیدرود کرخه و دریاچه نمک، اثرات مخربی بر شرایط هیدرولوژیکی و فرسایش و رسوب آن‌ها می‌گذارند (Balouei & Soltani Kopaei, 2021). به‌طوری‌که با تغییر در کاربری/پوشش اراضی ناشی از مداخلات مخرب انسانی، پاسخ‌های هیدرولوژیک آبخیزهای مذکور دچار تغییر می‌شوند و با ادامه شرایط و عدم مدیریت آن‌ها، عملکرد حوزه‌های آبخیز از شرایط متوقع خارج خواهد شد. از سوی دیگر، تخریب پوشش گیاهی جنگلی و مرتعی و تبدیل آن‌ها به زمین‌های بایر می‌تواند افزایش دبی اوج، حجم سیلاب، کاهش زمان تأخیر، زمان تمرکز و دبی اوج (Soltani *et al.*, 2021) را در آبخیزهای مستعد سیلاب مانند بندرعباس-سدج، هامون مشکیل، رودخانه‌ای تالش، رودخانه‌های بین سفیدرود و هزار، حله و جراحی و زهره در پی داشته باشد.

همین‌راستا، مدیر می‌تواند با توجه به عملکرد هر آبخیز رده دوم در هر یک از متغیرهای مورد بررسی اقدامات مدیریتی مناسبی را اتخاذ کند. بنا بر این، نتایج پژوهش حاضر می‌تواند زیربنای خوبی برای تمرکز توجهات بخش‌ها و سازمان‌های متولی حفاظت منابع آب‌وخاک کشور در خصوص سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در مقیاس ملی و سپس انجام مطالعات تفصیلی و هدف‌مدارانه در مقیاس‌های بزرگ در آبخیزهای با اولویت بالا باشند. اگرچه انجام پژوهش‌های گسترده‌تر با معیارهای متعدد و همچنین سایر شیوه‌های اولویت‌بندی مبتنی بر تئوری بازی و با سایر رویکردهای مشابه و بر اساس معیارهای فنی توصیه می‌شود.

که مدیر مربوطه یا فرایند اولویت‌بندی، نوع معیارها و همچنین هدف مطالعه حاضر آگاهی کامل داشته باشد تا پس از آن از نتایج اولویت‌بندی پژوهش حاضر در حیطه کاری مربوط به خود استفاده کند. در چنین حالتی، مدیر مربوطه قادر خواهد بود تا اولویت‌دارترین آبخیزها در هر یک از معیارهای موردبررسی و همچنین در مجموع معیارهای مطالعاتی شناسایی و اقدامات مدیریتی مرتبط را انجام دهد. از همین‌رو، می‌توان دریافت که نتایج حاصل از مقیاس مورد استفاده در پژوهش فعلی، امکان تهیه و تدوین طرح‌های اجرایی مدیریت آبخیزهای کشور را مهیا نمی‌کند اما نتایج حاصل از پژوهش حاضر می‌تواند مدیر را در شناسایی بحرانی‌ترین زیرآبخیزها از نظر هر یک از متغیرهای مورد بررسی و همچنین در مجموع تمامی متغیرها کمک کنند. در



شکل ۲- اولویت‌بندی مقایسه‌ای وضعیت و شرایط عملکردی آبخیزهای رده دوم کشور بر اساس روش Condorcet
Figure 2. Comparative prioritization of the status and functional conditions of Iran's Second-Order Watersheds based on the Condorcet method

نویسندگان از حمایت‌های مرکز بین‌المللی نوع دوم یونسکو در زمینه مدیریت جامع آبخیزداری و منابع زیستی برای مناطق خشک و نیمه‌خشک در ایران مستقر در سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تقدیر می‌کنند.

تشکر و قدردانی

پژوهش حاضر با حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران ریاست‌جمهوری (بنیاد علم ایران) (طرح شماره ۴۰۲۷۵۹) در دانشگاه تربیت مدرس انجام گرفته است. همچنین،

References

- Abatzoglou, J. T., Dobrowski, S. Z., Parks, S. A., & Hegewisch, K. C. (2018) TerraClimate, a high-resolution global dataset of monthly climate and climatic water balance from 1958–2015. *Scientific Data*, 5(1), 1-12.
- Abbaspour, M., Javid, A.H., Mirbagheri, S.A., Ahmadi Givi, F., & Moghimi, P. (2012) Investigation of lake drying attributed to climate change. *International Journal of Environmental Science and Technology*, 9, 257-266
- Adhami, M., & Sadeghi, S.H.R. (2016) Sub-watershed prioritization based on sediment yield using game theory. *Journal of Hydrology*, 541, 977-987
- Adhami, M., Sadeghi, S.H.R., & Sheikhmohammady, M. (2018) Making competent land use policy using a co-management framework. *Land Use Policy*, 72, 171-180
- Ahmadi, T., Nouri, H., & Ildromi, A. (2021) Investigation on impacts of drought on landuse/landcover (lu/lc) and groundwater level changes in Razan-Ghavavand Plain. *Iranian Journal of Watershed Management Science and Engineering*, 15(52), 33-43. [In Persian]
- Akbari, N., Niksokhan, M. H., & Ardestani, M. (2015) Optimal water allocation using cooperative game theory (Case Study: Zayandeh Roud Watershed). *Journal of Environmental Studies*, 40(4), 875-889.

- Akbarzadeh, P., & Nikoo, S. H. (2022) The investigation of the effects of the regional development in the form of change in land use on the groundwater aquifer level (A Case Study: Damghan Watershed). *Geography and Environmental Sustainability*, 12, 44 1-21. [In Persian]
- Alimoradi, M., Talebi, A., & Karemi, H. (2021). Analysis of factors affecting watershed management and providing appropriate management strategy using the SWOT model (Doeiraj River Watershed Area). *Extension and Development of Watershed Management*, 9(35), 1-11.
- Amir, A., & Fisher, F.M. (1991) Analyzing agricultural demand for water with an optimizing model. *Agricultural Systems*, 61, 45-56
- Ashraf, S., Nazemi, A., & AghaKouchak, A. (2021). Anthropogenic drought dominates groundwater depletion in Iran. *Scientific Reports*, 11(1), 9135.
- Avand, M., Khiavi, A. N., Mohammadi, M., & Tiefenbacher, J. P. (2023). Prioritizing sub-watersheds based on soil-erosion potential by integrating RUSLE and game-theory algorithms. *Advances in Space Research*, 72(2), 471-487.
- Avand, MT., Nasiri Khiavi, A., Khazaei, M., & Tiefenbacher, J. P. (2021) Determination of flood probability and prioritization of sub-watersheds A comparison of game theory to machine learning. *Journal of Environmental Management*, 295, 1-14
- Balouei, F., & Soltani Kopaei, S. (2021) Effect of land use change on surface runoff using SWAT and GIS in Doiraj Watershed of Ilam Province. *Iranian Journal of Watershed Management Science and Engineering*, 15(53), 1-11. [In Persian]
- Banerjee, C., & Kumar D. N. (2018) Analyzing large-scale hydrologic processes using GRACE and hydrometeorological datasets. *Water Resources Management*, 32, 4409-4423.
- Banihabib, ME., Najafi Marghmaleki, S., & Shabestari, M. H. (2019) An integrated water resources planning model for assessment and prediction of environmental water supplying for Hawizeh Wetland from Turkey Iraq and Iran. *Iranian Water Research Journal*, 13(32), 115-126. [In Persian]
- Bekele, E. G., & Nicklow, J. W. (2005) Multi objective management of ecosystem services by integrative watershed modeling and evolutionary algorithms. *Water Resources Research*, 41(W10406), 1-10.
- Borsdorff, T., Aan de Brugh, J., Hu, H., Aben, I., Hasekamp, O., & Landgraf, J. (2018). Measuring carbon monoxide with TROPOMI: First results and a comparison with ECMWF-IFS analysis data. *Geophysical Research Letters*, 45(6), 2826-2832.
- Chamani, R., Azari Mahmood, A., & Kralisch, S. (2020) Hydrological response to future climate changes in Chehelchay Watershed in Golestan Province. *Watershed Engineering and Management* 12(1), 72-85. [In Persian]
- Colman, A. M., Pulford, B. D., & Rose, J. (2008) Collective rationality in interactive decisions: evidence for team reasoning. *Acta Psychologica*, 128(2), 387-397
- Da Silva, C. M., Teixeira, O. N., & Ishihara, J. H. (2023) Use of Game Theory as a tool for identifying and mitigating conflicts over water use in the area covered by the Estreito HPP-MA-Brazil. *Aguayo Territorio/Water and Landscape*, 21, 121-133. <https://doi.org/10.17561/at.21.5896>
- Daneshi, A., Vafakhah, M., & Panahi, M. (2017) Evaluation of Urmia Lake crisis management solutions with an emphasis on maximum participation of farmers (Case Study: Simineroud Watershed). *Range and Watershed Management*, 70(2), 299-314. [In Persian]
- Davudirad, A. A., Sadeghi, S.H.R., & Sadoddin, A. (2016) The impact of development plans on hydrological changes in the Shazand Watershed Iran. *Land Degradation & Development*, 27(4), 1236-1244
- Dragan, A., Savic, J. B., & Mark, S. M. (2011) A DSS Generator for Multi-Objective Optimization of Spreadsheet-Based models. *Journal of Environmental Modeling and Software*, 26(5), 551-561
- Eleftheriadou, E., & Mylopoulos, Y. (2008) Game theoretical approach to conflict resolution in transboundary water resources management. *Journal of Water Resource Planning and Management*, 134(5), 466-473
- Faal Jalali, A., Ghasemi, M., & Minaei, M. (2021) implementation strategies for reducing the change of agricultural land use (Case study: Binalood County). *Journal of the Studies of Human Settlements Planning (Journal of Geographical Landscape)*, 16(1), 155-174. [In Persian]
- Gharekhani, A., Ghahreman, N., & Bazrafshan, J. (2013) Trend analysis of pan evaporation in different climates of Iran. *Watershed Management Researches (Pajouhesh-Va-Sazandegi)*, 26(1), 85-97. [In Persian]
- Han, X., Wang, P., Wang, J., Qiao, M., & Zhao, X. (2020). Evaluation of human-environment system vulnerability for sustainable development in the Liupan Mountainous Region of Ningxia, China. *Environmental Development*, 34, p.100525.
- Heidari, SH., Hanachi, P., & Teymoortash, S. (2019) The adaptive reuse of industrial heritage an approach based on energy recycle. *Naqshejahan- Basic studies and New Technologies of Architecture and Planning*, 9(1), 45-53. [In Persian]
- Hoseini, Z., Mozafari, M., & Finaji, E. (2021) Impact of land use changes and expanding of irrigation on drying up of the Bakhtegan and Tashk Lakes. *Civil Infrastructure Researches*, 7(1), 53-65. [In Persian]
- Ichiishi, T. (2014) Game Theory for Economic Analysis. *Elsevier*.
- Jalili Kamjoo, S. P., & Khosh Akhlagh, R. (2016) Using the game theory in optimal allocation of water in Zayandehrud. *Journal of Applied Economics Studies*, 5(18), 53-80. [In Persian]
- Kucukmehmetoglu, M. (2012). An integrative case study approach between game theory and Pareto frontier concepts for the transboundary water resources allocations. *Journal of Hydrology*, 450, 308-319.

- Lamy, F., Bolte, J., Santelmann, M., & Smith, C. (2002) Development and evaluation of multiple- objective decision-making methods for watershed management planning. *Journal of the American Water Resources Association*, 38(2), 517-52.
- Laukkanen, S., Kangas, A., & Kangas, J. (2002) Applying voting theory in natural resource management a case of multiple-criteria group decision support. *Journal of Environmental Management*, 64(2), 127-137.
- Lee, C. S. (2012) Multi-Objective Game-theory models for conflict analysis in reservoir watershed management. *Chemosphere*, 87(6), 608-613.
- Liang, D., Zuo, Y., Huang, L., Zhao, J., Teng, L., & Yang, F. (2015) Evaluation of the consistency of MODIS Land Cover Product (MCD12Q1) based on Chinese 30 m GlobeLand30 datasets: A case study in Anhui Province, China. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, 4(4), 2519-2541.
- Lunetta, R. S., Knight, J. F., Ediriwickrema, J., Lyon, J. G., & Worthy, L. D. (2022) Land-cover change detection using multi-temporal MODIS NDVI data. In *Geospatial Information Handbook for Water Resources and Watershed Management*, Volume II (pp. 65-88). CRC Press.
- Madani, K. (2010). Game theory and water resources. *Journal of Hydrology*, 381(3-4), 225-238.
- Madani, K., Rouhani, O. M., Mirchi, A., & Gholizadeh, S. (2014). A negotiation support system for resolving an international trans-boundary natural resource conflict. *Environmental Modelling and Software*, 51, 240-249
- Masoomi, H., Malekian, A., Salajegheh, A., & Nazari Samani, A. (2020). An Assessment of the Effect of Land Use Change on the Runoff Using the Markov Chain and Cellular Automata in the Bidgol Watershed the Province of Fars. *Watershed Management Research*, 33(2), 31-51. [In Persian]
- McKinney, D., & Teasley, R. (2007). Cooperative game theory for transboundary river basins the Syr Darya Basin. *World Environmental and Water Resources Congress Tampa Florida*, 1-10.
- Mendoza, GA., & Martins, H. (2006). Multi-Criteria Decision Analysis in natural resource management a critical review of methods and new modelling paradigms forest. *Ecology and Management*, 230(1), 1-22.
- Mohammadi, S., Karimzadeh, H., & Alizadeh, M. (2018). Spatial estimation of soil erosion in Iran using RUSLE model. *Journal of Ecohydrology*, 5(2), 551-569. [In Persian]
- Najafi, S. (2015). Assessing Watershed Management Position in the five-year development Documents of Iran. *Extension and Development of Watershed Management*, 3(10), 1-10.
- Nasiri Khiavi, A., Vafakhah, M., & Sadeghi, S.H.R. (2023). Application of participatory approach in identifying critical sub-watersheds based on flood generation potential in the Cheshmeh-Kileh Watershed Mazandaran Province. *Water and Soil Management and Modeling*, 3(3), 90-107. [In Persian]
- Nikjoy, M. (2023). Evaluation of performance and review of exit strategy in the management of Chelchah watershed. *Comprehensive Watershed Management*, online publication. https://iwm.ilam.ac.ir/article_708914.html.
- Nikkami, D., Elektorowicz, M., & Mehuys, G. R. (2002) Optimizing the management of soil erosion water quality. *Research Journal of Canada* 37(3), 577-586
- Olatinwo, S. O., & Joubert, T. H. (2023) A bibliometric analysis and review of resource management in internet of water things the use of game theory. *Water*, 14(10), 1636.
- Parrachino, I., Dinar, A., & Patrone, F. (2006) Cooperative game theory and its application to natural. environmental and water resources issues 3 Application to water resources. *World Rank Policy Research Working Paper*, 4074.
- Petetin, H., Guevara, M., Compernelle, S., Bowdalo, D., Bretonnière, P. A., Enciso, S., & Pérez García-Pando, C. (2023) Potential of TROPOMI for understanding spatio-temporal variations in surface NO2 and their dependencies upon land use over the Iberian Peninsula. *Atmospheric Chemistry and Physics*, 23(7), 3905-3935.
- Pourghasemi, H. R., Biswajeet, P., & Candan, G. (2012) Application of fuzzy logic and analytical hierarchy process (ahp) to landslide susceptibility mapping at Haraz Watershed Iran. *Natural Hazards* 63(2), 965-996.
- Poursepahy Samian, H., & Kerachian, R. (2011). Water allocation in common rivers: application of game theory. In *6th National Congress on Civil Engineering, Semnan*. [In Persian]
- Rivest, R. L., & Shen, E. (2010) An optimal single-winner preferential voting system based on game theory. in *Proc of 3rd International Workshop on Computational Social Choice 13 Sep*, 399-410.
- Sadeghi, S.H.R., Chamani, R., Zabihi Silabi, M., Tavosi, M., Katebikord, A., Khaledi Darvishan, A., Moosavi, V., Sadeghi, P. S., Vafakhah, M., & Moradi Rekabdarkolaei, H. (2023). Watershed health and ecological security zoning throughout Iran. *Science of The Total Environment*, <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.167123>.
- Sadeghi, S.H.R., & Hazbavi, Z. (2017) Spatiotemporal variation of watershed health propensity through reliability-resilience-vulnerability based drought index (case study: Shazand Watershed in Iran). *Science of the Total Environment*, 587, 168-176.
- Sadeghi, S. H., Silabi, M. Z., & Vafakhah, M. (2024). Soil erosion-based sub-watershed prioritization through coupling various crop management and erosivity scenarios using game theory. *Advances in Space Research*, 73(12), 5822-5835.
- Sadeghi, S.H.R., Kazemikia, S., & Hazbavi, Z. (2018a). Selection of representative watersheds in Iran. *The Integrated Watershed Management National Master Plan*, 163 p. [In Persian]

- Sadeghi, S.H.R., & Tavangar, S. H. (2015). Development of stational models for estimation of rainfall erosivity factor in different timescales. *Natural Hazards*, 77, 429-443.
- Sadeghi, S. H., Kalehouei, M., Yekdangi, F. K., Radkianpour, M., & Dadizadeh, Y. (2024). Biological Control of Soil Erosion in the Kilanbar Watershed, Kermanshah Province, Iran. *Journal of Watershed Management Research*, 15(1), 1-13. [In Persian]
- Sadeghi, S.H.R., Vafakhah, M., Moosavi, V., Pourfallah Asadabadi, S., Sadeghi, P. S., Khaledi Darvishan, A., Bagheri Fahraji, R., Mosavinia, S. H., Majidnia, A., Gharemahmudli, S., & Rekabdarkolaei, H. M. (2022). Assessing the health and ecological security of a human induced watershed in central Iran. *Ecosystem Health and Sustainability*, 8(1), 2090447.
- Sadeghi, S.H.R., Zabihi Silabi, M., Bordoni, M., Nguyen, T. N. A., Maerker, M., & Claudia, M. (2024). A game theory-based prioritization of drought affected demo vineyards using soil main properties in the northern apennines, Italy. *Catena*, 237, 107767.
- Sadeghi, S.H.R., Zabihi Silabi, M., Katebikord, A., & Mostafazadeh, R. (2023). Soil Erosion Dynamic on Storm-Basis due to Land Use Correction in the High Priority Sub-Watersheds of the Galazchai Watershed, West Azerbaijan, Iran, *Journal of Watershed Management Research*, 13(26), 21-33. [In Persian]
- Sadeghi, S.H.R., Zabihi Silabi, M., Sarvi Sadrabad, H., Riahi, M., & Modarresi Tabatabaei, S. (2023). Watershed health and ecological security modeling using anthropogenic, hydrologic, and climatic factors. *Natural Resource Modeling*, e12371.
- Safaei, A., & Malek Mohammadi, B. (2014). Game Theoretic Insights for Sustainable Common Poll Water Resources Governance (Case Study: Lake Urmia Water Conflict). *Journal of Environmental Studies*, 40(1), 28-30
- Sheikhmohammady, M., & Madani, K. (2008) Sharing a multi-national resource through bankruptcy procedures in world. *Environmental and Water Resources Congress*.
- Shi, Z. H., Ai, L., Li, X., Huang, X. D., Wu, G.L., & Liao, W. (2013). Partial least squares regression for linking land-cover patterns to soil erosion and sediment yield in watersheds. *Journal of Hydrology*, 498, 165-176.
- Shirangi, E., Kerachian, R., & Bajestan, M. S. (2008). A simplified model for reservoir operation considering the water quality issues application of the young conflict resolution theory. *Environmental Monitoring and Assessment*, 146(1-3), 77-89.
- Soltani, S., Mokhtari, F., Mohit, P., & Kalhor, A. (2021). Evaluating the impact of land use change on increasing runoff in Khorramabad Watershed via HEC-HMS Model. *Desert Ecosystem Engineering Journal*, 10(30), 81-92. [In Persian]
- Talebi, A., Salehpour Jam, A., Kalehui, M., & Musfaei, J. (2022). The new approach in the worthy governance watershed and sustainable development. *Promotion and Development of Watershed Management*, 9(35), 54-61.
- Tecle, A., (1992). Selecting a multi criterion decision making technique for watershed resources management. *Journal of the American Water Resources Association*, 2(1), 129-140.
- Teka, K., Haftu, M., Ostwald, M., & Cederberg, C. (2020). Can integrated watershed management reduce soil erosion and improve livelihoods? A study from northern Ethiopia. *International Soil and Water Conservation Research*, 8(3), 266-276.
- Tofangchi Mahyari, M., Pendar, M., Sameni, A., & Khajeh Borj Sefidi, A. (2021). Analysis of the migration situation in iran's provinces with emphasis on social and cultural factors. *Geography and Territorial Spatial Arrangement*, 11(39), 55-80. [In Persian]
- Üçler, N., Engin, G. O., Köçken, H. G., & Öncel, M. S. (2015) Game theory and fuzzy programming approaches for bi-objective optimization of reservoir watershed management: A case study in Namazgah Reservoir. *Environmental Science and Pollution Research*, 22(9), 6546-6558.
- Vafakhah, M., Zabihi Silabi, M., Modarresi Tabatabaei, S., Sarvi Sadrabad, H., Shafiei Bafti, A., Ghaderi Dehkordi, N., Riahi, M., & Ghiasi, S. S. (2023). Detection of annual mean discharge trend over Iran. *Watershed Engineering and Management*, 15(2), 314-327.
- Weng, S. Q., Huang, G. H., & Li, Y. P. (2010). An integrated scenario-based multi-criteria decision support system for water resources management and planning, A case study in the Haihe River Basin. *Expert Systems with Applications*, 37(12), 8242-8254.
- Zabihi Silabi, M., Sadeghi, S. H., & Mostafazadeh, R. (2021). Effects of the Implementing Land use-based Scenarios in the Prioritized Sub-Watersheds on Soil Erosion and Sediment Yield of the Galazchai Watershed, Oshnavieh, Iran. *Degradation and Rehabilitation of Natural Land*. 2(3), 88-99. [In Persian]
- Zhu, K., Zhang, Y., Wang, M., & Liu, H. (2022). The Ecological Compensation Mechanism in a Cross-Regional Water Diversion Project Using Evolutionary Game Theory the Case of the Hanjiang River Basin China. *Water*, 14(7), 1151.